

**ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА**

Во время паводка следует учитывать, что повышается миграционная активность грызунов и происходит смена мест их обитания. Грызуны пытаются проникнуть в дома, нежилые и хозяйственные помещения, где есть защита и пропитание. Особое внимание следует обратить на объекты, находящиеся на возвышенности.

Известно, что грызуны играют большую роль в распространении природно-очаговых инфекционных заболеваний.

Проведение систематических дератизационных мероприятий позволяет полностью освободить объект от грызунов или уменьшить их численность на прилегающей территории и, тем самым, уменьшить вероятность заражения людей возбудителями инфекционных болезней.

Для проведения профилактических дератизационных мероприятий применяют механический способ уничтожения грызунов. Он подразумевает применение ловушек, капканов, заградительных электрических барьеров. Химический способ – наиболее популярный способ. Из-за высокой эффективности использования ядовитых приманок, такой метод позволяет с минимальными трудовыми затратами достичь хороших результатов. Для применения можно использовать различные зерновые, гранулированные приманки, брикеты, пену, повидло. Периодичность дератизации зависит от масштаба проблемы – плотности и площади заселенности.